



Nachsorgeempfehlung

Zu den Nachsorgeterminen in der Klinik für Tumororthopädie bitten wir die erforderliche Bildgebung auf CD mit schriftlichem Befund mitzuführen.

Desmoid Tumor (Aggressive Fibromatose)

Zeit (nach OP)	UK Essen	Heimatnah	watch-and-wait	Resektion	Thorax	Abd.
			MRT	MRT		
Erstdiagnose	X		X	X		
4 Monate		X	X	X		
8 Monate		X	X	X		
12 Monate	X		X	X		
16 Monate		X	X	X		
20 Monate		X	X	X		
24 Monate	X		X	X		
Halbjährlich Jahr 3-5		X	X	X		
5 Jahre		X	X	X		
Jährlich Jahr 6-9		X	X	X		
10 Jahre		X	X	X		
¹ b. Neuauftreten v. Beschwerden	ggf.	X	X	X		

¹bei **watch-and-wait** Fortsetzung der Nachsorge mittels MRT alle 2-3 Jahre oder b. Neuauftreten von Beschwerden
(NCCN 2018: every 3-6 months for 2-3 years, then every 6-12 months thereafter.)

Aktuell sind seitens der ESMO (European Society of Medical Oncology) und NCCN (National Comprehensive Cancer Network) Leitlinien zur onkologischen Nachsorge für Ihre Erkrankung festgelegt. Die vorstehenden Empfehlungen sind unter Anwendung größter Sorgfalt und Vorsicht aus dem Stand von Medizin und Forschung bei Drucklegung abgeleitet, deren Bestand jedoch wegen der ständigen Weiterentwicklung für die Zukunft nicht garantiert werden kann. Wenn Sie Veränderungen oder Auffälligkeiten bemerken, sollten Sie uns zu deren Abklärung sofort konsultieren.